

Ooglidcorrectie

Met een ooglidcorrectie krijgt u die frisse en energieke uitstraling terug

Stoort u zich ook zo aan die bedroefde gezichtsuitdrukking? Baalt u ook van die wallen onder uw ogen? Zit u niet meer lekker in uw vel omdat u er moe en ouder uitziet dan u eigenlijk bent? De experts van Marina Clinic kunnen u daarbij helpen!

Na een ooglidcorrectie ziet u er jonger en vitaler uit. Als uw bovenoogleden hangen of als u wallen onder uw ogen heeft, ontstaat er een vermoeide gezichtsuitdrukking. Verslachte huid van de bovenoogleden kan in extreme gevallen zelfs uw zicht belemmeren. Beide effecten treden vaak op bij ouderen, maar ook bij jonge mensen. Een ooglidcorrectie is een chirurgische ingreep onder lokale verdoving, waarbij overtollige huid van uw ooglid, een dunne laag spierweefsel en soms vetweefsel wordt weggenomen. Na de behandeling ziet u er jonger en vitaler uit en wordt kijken weer makkelijker.

Heeft u belangstelling voor een ooglidcorrectie?

Een eerste consult verplicht u tot niets, als u een verwijfsbrief heeft van uw huisarts dan wordt dit consult meestal geheel (of gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Tijdens de eerste afspraak krijgt u uitgebreide informatie over de behandeling, worden er foto's gemaakt en de chirurg zal een indicatie geven over de re-

sultaten en de kosten van de behandeling in uw individuele situatie. Wilt u ook uw frisse en energieke uitstraling terug? Bel ons en maak een afspraak voor een eerste consult. Dan ziet u er binnenkort weer net zo jong uit als u zich voelt!

Wat is een ooglidcorrectie?

Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden zo uitrekt dat hij tot op/over de wimpers heen gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan leiden tot gezichtsveldbeperking, hoofdpijn, vermoeide ogen, zwaar gevoel in de oogleden, branderige ogen, huidirritatie en problemen met het dragen van lenzen. Een vaak gehoorde klacht van patiënten is ook dat ze vinden dat ze er zo moe of ouder uitzien.

Blepharochalasis van de bovenoogleden is een gevolg van het slapper worden van de dunne huid rondom het oog. Soms gaat dit samen met het uitpuilen van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd en gaat plooiën of een bolling boven het oog laat zien. Verslapping van de huid van het ooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van chirurgie). Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid.

De behandeling

Correctie van de oogleden vindt onder

plaatselijke verdoving plaats. Bij een ingreep onder plaatselijke verdoving mag u enige tijd na de ingreep (met een begeleider) al weer naar huis. Vlak voor de operatie tekent de chirurg het huiddeel af dat weggenomen moet worden. Bij de operatie wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig spier- en vetweefsel, kan nu weggehaald worden. Het grootste deel van het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Zo'n litteken is nauwelijks zichtbaar.

Na de behandeling

Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er wordt geen verband aangebracht, zodat wassen en douchen (de ogen moeten liefst droog blijven) mogelijk blijft.

We raden u aan om thuis de oogleden het eerste dagdeel (6 uur) met coldpacks of een ijsbril te koelen. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vijf tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of crème kan worden ingesmeerd. Gedurende de eerste week na operatie wordt de patient geadviseerd zwaar werk, sporten, hoesten, persen en bukken te vermijden.

Risico's en complicaties

Soms komt bij een correctie van de bovenoogleden een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Bij iedere operatie is er kans op een wondinfectie (huidbacterie), zonodig wordt deze infectie behandeld met antibiotica. Ook kan het voorkomen dat u de ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u zonodig via de arts oogdruppels of -zalf verkrijgen die het uitdrogen tegengaan. Het resultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal langdurig, maar als de huid en de spier rondom het oog verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. Ook als de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn. Door littekenreactie kan het ooglid wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal over is.

Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan chirurgisch worden verwijderd.

Uw vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Marina Clinic

Pieterman 11

1131 PW Volendam

Telefoon: 0299 - 399 088

Email: info@marinaclinic.nl

Buiten kantooruren en bij spoed

kunt u contact opnemen met de dienstdoende Mond-, Kaak- en Aangezichts-chirurg via het algemene nummer van Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar (NWZ): 072 - 548 44 44.

Meer informatie vindt u ook op:

www.marinaclinic.nl

www.nwz.nl

Notities

Pieterman 11
1131 PW Volendam

Telefoon 0299-399088

Fax 0299-399089

Email info@marinaclinic.nl

marinaclinic.nl